




För ordinatorer/förskrivare med  
TakeCares läkemedelsmodul

## ■ Favoritordinationer – Gemensamma – SLL Kloka listan



Sök preparat - Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil ver. 5.0 (2019-01-30) - Stockholms läns landsting

Varning Ordna favoriter Sök efter:

Läkemedel Ej godkända läkemedel Hjälpmedel / livsmedel

ATC Preparat **Favoritordinationer** Skapa eget preparat

Privata  
Vårdenhetens favoriter  
Vårdenhetens generella direktiv  
**Gemensamma**

Samtliga  
**SLL Kloka Listan**  
Blodprodukter/Syrgas  
Pascal-dos  
BARN  
Aleris  
Capio  
DS Danderyds sjukhus  
Ersta sjukhus  
Got Gotland  
K Karolinska  
SI SO

**Gemensamma - SLL Kloka Listan (inkl undermappar)**

Namn	Mapp
Dospatient i öppenvård - se Pascal!	Pascal-dos
Ska remitteras till barnakut	Cystit hos barn <2år, i
SLL acetylsalicylsyra, T. 500mg, 1:a hand (Bamyl brus)	Migrän hos vuxna, anf
SLL acetylsalicylsyra, T. 75 mg (Trombyl)	Trombocythämmare, is
SLL acetylsalicylsyra, T. 75 mg (Trombyl)	Perifer artärsjukdom
SLL adapalen+bensoylperoxid, 0,3%/2,5%, 1:a hand (Epiduo)	Medelsvår till svår pap
SLL adapalen+bensoylperoxid, gel 0,1%/2,5% (Epiduo)	Lindrig till medelsvår ak
SLL adapalen, gel, 1mg/g (Differin)	Lindrig till medelsvår ak
SLL adapalen, kräm 1 mg/g (Differin)	Lindrig till medelsvår ak
SLL adrenalin, inj. Pen., 300mikrog, >30kg, Emerade (Epipen, Anapen)	Anafylaxi och svår alle
SLL adrenalin, inj. Pen., 300mikrog, >30kg, Epipen (Emerade, Anapen)	Anafylaxi och svår alle
<b>SLL adrenalin, inj. pen, 150 mikrog., 15-30kg, Emerade (Epipen)</b>	Anafylaxi och svår alle
SLL adrenalin, inj. pen, 150 mikrog., 15-30kg, Epipen (Emerade)	Anafylaxi och svår alle



# KLOKA LISTAN

## Gemensamma ordinationsmallar

Enkla att använda!

Sökbara på:

- Substans
- Preparat
- Indikation
- Mappträd

### Estimerade effekter av gemensamma ordinationsmallar

Gemensamma och kvalitetssäkrade ordinationsmallar för hela SLL med strukturerad och kontinuerlig förvaltning torde ge:

- **Kvalitetsvinster**
  - Bättre doseringstexter till patienterna
  - Bättre administreringstexter till sjuksköterska
  - Mer korrekt ifyllda ordinationer som underlättar uppföljning
  - Fler avslutade antibiotikakurer då vissa mallar är tidsbegränsade
  - Mindre risk för slarvfel.
- **Tidsvinster**
  - Vid ordinationstillfället eftersom mycket är förifyllt. Om varje läkare sparar en minut per nyordination av ett Kloka Listan-preparat så skulle det bli en total tidsbesparing motsvarande nästan 5000 dagar per år i SLL.
  - Vid förvaltningen då det blir mindre dubbelarbete med detta inom SLL.
- **Större möjlighet till styrning och uppföljning av ordinationerna**



KLOKA LISTAN


2019

Stockholms läns läkemedelskommitté  
Stockholms läns landsting

## Tänk dig att du bläddrar i Kloka listan.

Patienten är vuxen och du gör bedömningen att hen utvecklat astma och har besvär någon enstaka gång i veckan.

Välj Astma hos vuxna...



**Gemensamma - Astma hos vuxna (inkl undermappar)**

Namn	Mapp
SLL betametason, T. 0,5 mg, Bolusdos Steroid (Betapred)	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling
SLL budesonid+formoterol, inh 80/4,5 mikrog/dos 1:a hand (Bufomix,Symbico)	Astma steg 3 - kombination
SLL budesonid+formoterol, inh. 160/4,5 mikrog/dos 1:a hand (Bufomix,Symbi)	Astma steg 3 - kombination
SLL budesonid+formoterol, inh. 320/9 mikrog/dos 1:a hand (Bufomix,Symbicor)	Astma steg 3 - kombination
SLL budesonid, inh. 100 mikrog/dos, 1:a hand(Giona, Pulmicort)	Astma steg 2 - inhalationssteroid
SLL budesonid, inh. 200 mikrog/dos, 1:a hand(Giona, Pulmicort)	Astma steg 2 - inhalationssteroid
SLL budesonid, inh. 400 mikrog/dos, 1:a hand(Giona, Pulmicort)	Astma steg 2 - inhalationssteroid
SLL ciklesonid, inh.spr. 160 mikrog/dos, 2:a hand spacer (Alvesco)	Astma steg 2 - inhalationssteroid
SLL flutikason+formoterol inh. 50/5 mikrog/dos 2:a hand spacer(Flutiform)	Astma steg 3 - kombination
SLL flutikason+formoterol, inh. 125/5 mikrog/dos 2:ahand spacer(Flutiform)	Astma steg 3 - kombination
SLL flutikason+formoterol, inh. 250/10 mikrog/dos 2:ahand spacer(Flutiform)	Astma steg 3 - kombination
SLL För inhalationer vid akut astma se KOL/Astma akutbehandling	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling
SLL prednisolon, T. 5 mg, 5 dagar lågdos(Prednisolon)	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling
SLL prednisolon, T. 5 mg, 7 dagar högdos(Prednisolon)	Astma, akutbehandling/korttidsbehandling
SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare
SLL salbutamol inh 200 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare
SLL terbutalin inh 0,25 mg/dos 2:a hand (Bricanyl)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare

# Tänk dig att du bläddrar i Kloka listan-boken eller på janusinfo.se



## KLOKA LISTAN



Stockholms läns läkemedelskommitté  
Stockholms läns landsting

●●● Forts. Astma hos vuxna

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Utvärdera behandlingen med ACT (Asthma Control Test); [www.viss.nu](http://www.viss.nu).

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars. **Behandla allergi och astma under graviditet och amning;** [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. **Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator;** [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)

**Inhalera rätt,** instruktionsfilmer på [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)  
**Astma hos vuxna;** [www.viss.nu](http://www.viss.nu)  
**Läkemedelsbehandling vid astma;** [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

### Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

#### KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

##### I första hand

*salbutamol* Buventol Easyhaler

**I andra hand** – vid svårighet att hantera pulverinhalator

*salbutamol* Airomir spray (med spacer)

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

### Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

#### INHALATIONSSTEROIDER

##### I första hand

*budesonid* Giona Easyhaler

**I andra hand** – vid svårighet att hantera pulverinhalator

*ciklesonid* Alvesco spray (med spacer)

●●● Andningsvägar

### Steg 3

Kvarstående astmabesvär

Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroid innan långverkande beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska alltid behållas då LABA läggs till.

#### KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

*budesonid + formoterol* Bufomix Easyhaler

**I andra hand** – vid svårighet att hantera pulverinhalator

*flutikason + formoterol* Flutiform spray (med spacer)

#### Astma hos barn och ungdomar

Lär patienten att inhalera rätt!



#### Hälsosamma levnadsvanor

- Rekommendera rökstopp och erbjud stödjägar insatser. Gäller även föräldrar som röker. Läs om **Nikotinberoende** på sid 118.
- Regelbunden fysisk aktivitet. **Rekommenderad fysisk aktivitet vid astma;** [www.fys.se](http://www.fys.se)

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. För barn i åldern 4-11 år, utvärdera behandlingen med CACT (Childhood Asthma Control Test).

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas. **Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator;** [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)

**Inhalera rätt,** instruktionsfilmer på [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)  
**Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar;** [www.viss.nu](http://www.viss.nu)  
**Läkemedelsbehandling vid astma;** [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

forts. 13

●●● forts. Astma hos vuxna

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Utvärdera behandlingen med ACT (Asthma Control Test); [www.viss.nu](http://www.viss.nu).

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars. **Behandla allergi och astma under graviditet och amning;** [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. **Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator;** [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)

**Inhalera rätt,** instruktionsfilmer på [www.janusinfo.se](http://www.janusinfo.se)  
**Astma hos vuxna;** [www.viss.nu](http://www.viss.nu)  
**Läkemedelsbehandling vid astma;** [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

#### KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

##### I första hand

*salbutamol* Buventol Easyhaler

**I andra hand** – vid svårighet att hantera pulverinhalator

*salbutamol* Airomir spray (med spacer)

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

## Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

#### INHALATIONSSTEROIDER


##### I första hand

*budesonid* Giona Easyhaler

**I andra hand** – vid svårighet att hantera pulverinhalator

*ciklesonid* Alvesco spray (med spacer)

Minska sökningen genom att välja en mapp/rubrik; här  
Astma steg 1 – kortverkande beta 2 stimulerare




**Gemensamma - Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare (inkl undermappar)**

Namn	Mapp	Spar
SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-
SLL salbutamol inh 200 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-
SLL terbutalin inh 0.25 mg/dos 2:a hand (Bricanyl)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-
SLL, salbutamol inh 0,1mg/dos 2:a hand spacer (Airon, Buven, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande beta 2 stimulerare	2018-

Välj salbutamol (generisk substans), även sökbart på vanliga preparat t ex Buventol.

Välj 100 mikrog/dos eller 200 mikrog/dos

Även sökbart i rutan **Sök efter:**  
 Sökningen utgår från vilken nivå du står på i vänstra mappstrukturen



Sök preparat - Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil ver. 5.0 (2019-01-30) - Stockholms läns landsting

Varning Ordna favoriter Sök efter: vent

Läkemedel Ej godkända läkemedel Hjälpmedel / livsmedel

ATC Preparat Favoritordinationer Skapa eget preparat

Privata  
 Vårdenhetens favoriter  
 Vårdenhetens generella direktiv  
 Gemensamma

SLL Kloka Listan  
 Pascal-dos  
 Kontakt vid fel på fav  
 Anafylaxi och svår al  
 Andningsvägar  
 Allergisk rinokonji  
 Persisterande ick  
 Näspolypos  
 Återkommande ri  
 Pseudokrupp  
 Astma hos vuxna  
 Astma steg 1  
 Astma steg 2  
 Astma steg 3  
 Astma, akutt  
 Astma hos barn c

Gemensamma - SLL Kloka Listan (inkl undermappar)

Namn	Mapp
SLL ipratropium, inh. Spray, 20 mikrogram (Atrovent)	KOL, GOLD A, Lindriga eller spo
SLL ipratropium, inh.spray., 20 mikrog/dos, spacer, 1:a hand (Atrovent)	KOL/Astma Akutbehandling/kort
SLL ipratropium, lösning för nebulisator, 0,5mg/dos, 2:a hand (Atrovent)	KOL/Astma Akutbehandling/kort
SLL ipratropium, nässpr. 42 mikrog/dos, rinorré (Atrovent Nasal)	Persisterande icke-allergisk rinit
SLL omeprazol, K. 20mg, DUODENALULCUS (Omeocat, Omestad)	HP-neg duodenal- och ventrikeli
SLL omeprazol, K. 20mg, VENTRIKELULCUS (Omeocat, Omestad)	HP-neg duodenal- och ventrikeli
SLL omeprazol, K. 20mg, VENTRIKELULCUS ef HP-behandling (Omeocat, Omestad)	HP-positivt duodenal- och ventr
SLL omeprazol, K. 20mg, VENTRIKELULCUS efter eradikering (Omeocat, Omestad)	Pc-allergi eller terapivikt HP-po
SLL PAKET omeprazol+amoxicillin+klaritromycin - ERADIKERING - 1a hand	HP-positivt duodenal- och ventr
SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande be
SLL salbutamol inh 200 mikrog/dos 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande be
SLL salbutamol, inh 100 mikrog/dos 7-17 år 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma barn 7-17 år - Steg 1
SLL salbutamol, inh 200 mikrog/dos 7-17 år 1:a hand (Buventol, Ventoline)	Astma barn 7-17 år - Steg 1
SLL salbutamol, inh. pulver, 100 mikrogram/dos (Buventol,Ventoline)	KOL, GOLD A, Lindriga eller spo
SLL salbutamol, inh. pulver, 200 mikrogram/dos (Buventol,Ventoline)	KOL, GOLD A, Lindriga eller spo
SLL, salbutamol inh 0,1mg/dos 2:a hand spacer (Airom, Buven, Ventoline)	Astma steg 1 - kortverkande be
SLL, salbutamol, inh 0,1mg/dos, spacer (Airomir, Ventoline)	KOL, GOLD A, Lindriga eller spo
SLL, salmeterol, inh.susp, 25 mikrog, 2:a hand LABA (Serevent)	KOL, GOLD B, Betydande symtc



Ordination - 19 121212-1212 Tolvanesson Tolvan / SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny Varning...

Preparat (1 st)	Läkemedelsform	Styrka eller förpackning	Dosenhet *	Tillverkare
Buventol Easyhaler	inhalationspulver	100 mikrog/dos	st	Orion Pharma AB

Ta bort  
Blandning

Adm. väg: \* Inhalation  
Adm. metod:  
Adm. tillfälle:

Adm. instruktion: SSK: skölj munnen efteråt  
Får ej bytas ut:  
Får ej dosdispenseras:

Måndag 29 januari (Idag) Vid behov Doseringshjälp

Adm. tid	v.b.
Buventol Easyhaler, inhalationspulver 100 mikrog/dos	1

Max dos/dygn (st): \* 8 st  
Max dos/dygn ej aktuellt

Pat sköter själv adm.:  
Ordinator: \*  
Extern ordination:

Doseringsanvisning för recept: Inkludera autotext:  
1-2 puffar vid behov inandas. Luftrörsvidgande mot astma. Dosen kan dubbleras i samband med försämring, t.ex. vid förkylning. Skölj munnen efteråt. Fortsätt ta regelbundet även om du inte har några symptom. Max 8 st/dygn.

Ord. gäller fr.o.m. Fr.o.m.: \* 2018-01-29  
Beh.orsak: luftrörsvidgande mot astma  
Mål:

Nytt ställningstagande Datum: Namn:

Ord. gäller t.o.m. \* T.o.m.:  
Tillsvidare:  
Uts.orsak:


Information  
Överkänslighet  
Ordinationer med liknande ATC-kod  
Bufomix Easyhaler, inha... R03A  
Innovair, inhalationssp... R03A  
Mätvärden  
Ålder: 105 år  
Ord. vikt: 90 kg 2018-01-29  
Vikt: 95 kg 2018-01-26  
Registra  
Rimlighetskontroll  
Ej aktiv  
Buventol Easyhaler  
Framtida dosändringar

Ordinatören är ansvarig för hela ordinationen, trots att vissa fält är förifyllda

Utförlig text på recepten. Går alltid ändra texten så att den passar just den specifika patienten.

# Snarlik information i mallarna;

Olika behandlingsorsaker ger olika mallar.  
Olika doseringar kan ge olika mallar.




The image shows two side-by-side screenshots of a medical prescription software interface. Red circles highlight specific fields in both screenshots:

- Left Screenshot:**
  - Medication name: **SLL salbutamol inh 100 mikrog/dos 1:a hand (Buventol,Ventoline)**
  - Administration route: **Inhalation**
  - Dosage: **100 mikrog/dos**
  - Behavioral cause: **luftrörsvidgande mot astma**
  - Instruction: **1-2 puffar inandas vid behov 1-4 gånger dagligen. Kortverkande luftrörsvidgande mot astma.**
- Right Screenshot:**
  - Medication name: **SLL salbutamol, inh. pulver, 100 mikrogram/dos (Buventol,Ventoline)**
  - Administration route: **Inhalation**
  - Dosage: **100 mikrog/dos**
  - Behavioral cause: **mot KOL**
  - Instruction: **LÄK: Vidbehovsmedicinering.**
  - Instruction: **1-2 puffar vid behov inandas 1-4 gånger dagligen. Kortverkande luftrörsvidgande vid KOL.**



# Upptäcker du något fel?



Kontaktuppgifter finns i mappträdet.

**[fo.lakemedelsprocess.ordinationsmallar.sll@sll.se](mailto:fo.lakemedelsprocess.ordinationsmallar.sll@sll.se)**